

الفقه والمسائل الطبية

(240) الغشاء المخاطي المبطن للرحم وينزل على هيئة دم الحيض. والسائل الحيضي عبارة عن دم غير متجلط مع مخاط مع بقايا خلايا الغشاء المخاطي الذي تفتت وتكون كميته قليلة ومخاطياً في أول الحيض، ثم يكون مائلاً للحمرة، ثم بني اللون في نهاية الحيض، وعند زيادة كمية الدم عن الطبيعي يتجلط الدم، وهذا يدل على زيادة النزيف(1). (الفصل الثالث): في سن البلوغ وسن اليأس (الايأس): واعلم أنَّهُ يتعين بلوغ الفتاة بظهور أول طمث ويبدأ عادة في سن الحادية عشرة وقليلًا ما يتأخر للثالثة أو الرابعة عشر، ونادرًا ما يكبر عن سن العاشرة، وتحول الطفلة من دور الطفولة الى دور الـنُوثة الكاملة، ونزول الحيض يختلف حسب الوراثة والاجناس والتغذية والحالة النفسية، ويختلف باختلاف الشعوب وطبيعة الحياة الاجتماعية. سن اليأس يشمل تغيرات كثيرة منها انقطاع الطمث، وفي العادة ينقطع الطمث عند سن الخامسة والاربعين الى سن الخامسة والخمسين، وربما يحدث قبل الاربعين أو بعد الخامسة والخمسين، وفي العادة ينقطع الطمث تدريجياً، ويحدث الطمث كل شهرين أو ثلاثة شهور الى ستة شهور، وبعد ذلك ينقطع نهائياً. ومن المعروف أنَّهُ اذا حدث سن البلوغ مبكراً تأخر سن اليأس، أو العكس كذلك، وهذا يتوقف على الجنس أيضاً وعلى الوراثة وطبيعة الـاكل والحالة الاقتصادية، وقد يكبر سن اليأس قبل سن الاربعين، ويرجع السبب في ذلك إمّا للحالة النفسية أو قصور في عمل المبيض أو استئصال المبيض

(1) م433 وم434 الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية.