

الفقه والمسائل الطبية

(134) من صاحبة الجنين لا غير كما عرفت سابقاً ، نعم الخلايا غير المنوية من أحد لا بأس بزراعتها في بدن جنين آخر. 3 - قيل: يمكن الاحتفاظ باللقحة الى خمسين سنة ، يعني حتّى الى ما بعد المعدل الاقصى لعمر الابوين، إذ المعتاد أن ° لا يباشر الاطباء عملية التلقيح المجري إلاّ ما بعد الثلاثين سنة من عمر الابوين(1). 4 - قيل: إنّهُ يمكن استخراج خمسين بويضة من امرأة واحدة، وإنّ أحد مراكز اطفال الانابيب كان لديه 1208 جنيناً فائضاً أودعت الثلجات وجمدت من 432 امرأة أُجريت لهن عملية طفل الانبوب(2). أقول: للحكومة منع انشاء الاجنة الفائضة عن مقدار الحاجة بتاتاّ سداً لذرائع الفساد والحرام لاّجل حصول الثروة - كما منعت المانيا الغربية على ما نقل - بل الاحسن منع استخراج البويضات الفائضة عن حاجة الزوجين مطلقاً. _____ (1) ص111 وص112 نفس المصدر. (2) ص174 نفس المصدر.