

الفقه والمسائل الطبية

(290) يجامع في الـسبوع مرتين وثمانين مرات في الشهر و96 مرة في السنة كان احتمال الإصابة أكثر من 40 أو من 50% في السنة الواحدة، فتصبح النسبة ضخمة (1). 2 - الحقن بمحاقن ملوثة بفيروسات المرض كما يحدث عند اشتراك مدمني المخدرات في حقن أنفسهم بمحاقن وإبر ملوثة. 3 - الدم ومشتقاته، سواء بنقل الدم العلاجي أو باستخدام الإبر والمحاقن الملوثة بالفيروس. 4 - انتقال العدوى من الأم للجنين: دل استعمال أحدث طريقة لكشف جزئيات الفيروس، على أن نسبة إصابة الجنين وهو في داخل الرحم بالعدوى هي نسبة ضئيلة لا تتجاوز عشرة بالمائة، وتحدث معظم حالات العدوى للجنين في أثناء الولادة من جراء تلوث الجنين بالمفرزات التناسلية المعدية بمعدل ثلاثين بالمائة، ولا تنتقل العدوى من الأم إلى الجنين في ستين بالمائة من الحالات (2). وقال بعض الأطباء: إن الدورة الدموية للام والجنين لا اتصال بينهما، والدورة الدموية للجنين مستقلة تماماً عن الدورة الدموية للأم، لكن بعض العوامل المرضية قد تخترق المشيمة، ولكن هذا لم يثبت فيما يتعلق بالنسبة للايدز (3). (الثاني): كلمة الايدز مركبة في الـحرف الـاولى بالانجليزية لاسم مرض خطير يدعى "متلازمة العوز المناعي المكتسب" وهو متلازمة أي _____ (1) ص535 نفس المصدر. (2) ص62 نفس المصدر. (3) ص328 نفس المصدر.